

嬰兒養育上之注意

(姚伯麟)

嬰兒食物中。母乳最適。故母乳如何飲之而無害。不致引起胃腸病乎。則定分定時定間。而後在生後。

第一星期者。由十至十五至十六至斯。

第二星期者。由十三至斯。以至十八至斯。

第三星期者。由十四至斯。以至二十四至斯。

第四星期者。由十六至斯。以至二十六至斯。

第五星期至第十三星期者。由二十至斯至三十六至斯。

第十四星期至第十六星期者。由二十四至斯至三十八至斯。

第十六星期至第十八星期者。由三十八至斯至四十二至斯。

約當中國八歲二三分三厘者。為母乳之適量。母乳由午前六時。至午後十時。兩小時一回。夜間每三小時一回。母乳者。不能哺乳者。

生後至第十月時。則其成分中之脂肪質。蛋白質減少。水分增多。遂成不適於哺乳者。故須予以少量之牛乳。又如粥之稀湯。漸次予以他物。以成習慣。

母乳者。小兒養育上。為最適當之食物。然產婦或時而有乳不足者。又以肺病梅毒腎臟病及其他產後疾病之故。有不能哺乳者。

(未完)

經驗良方

單方錄 (黃勝白)

全書歸一。支脈滋潤。不勝其可。治一切痛經及經期不調諸病。

此方余試之屢矣。靈效非常。治痛經尤佳。痛經無從定其其量。故服之者。僅至減輕而止。不能斷根也。博物志稱當歸能止痛。不可解。吾初謂當歸。原無止痛之用。後乃知所謂止痛者。殆即指止痛經而言也。此藥本極佳之品。惟中國有之。乃中國醫家自經寒熱之目。與他種補藥數十種。為老婦人熱毒煎藥之用。其真正之效用。乃全然隱矣。反是西人識其功能。製為流膏。Bismarck。主一切子宮月經各症。自是當歸出口日多。(廣東有專販當歸之店自成一街)而當歸

庫厥治療法

(李健剛)

定義 庫厥。與厥病相合也。

原因 寒氣外侵。冷氣內結。即成厥病。血行粘滯。

病理 年高血衰。氣機不旺。又因陰虛。寒冷外襲。侵入血中。血液受寒冷之阻滯。遂凝固質。凝滯不暢。則氣機不通。氣機阻滯。寒薄而厥。厥而發熱。素問金匱言曰。『冬春病庫厥』即此之故也。

症狀 初起發時。身必痛。胸氣脹滿。有如中風。六脈沉滯。肝心虛瀉。

診斷 此症非重用。壯補溫血之品。則莫能奏效。

功。和血理氣。緩凝祛寒為主。用妙當歸酒白芍。川芎。熟地。黃芪。半夏。威靈仙。羌活。獨活。附片。肉桂。防風。地黃。黃良。姜。巴。戟。等。常服即可奏功。

大東藥局

書名	冊數	折實價格
新時病論	四冊	七角
中西合參外科大全	二冊	一元〇八分
中西合參內科大全	二冊	一元〇八分
中西合參婦科大全	二冊	一元〇八分
中西合參兒科大全	二冊	一元〇八分
古今名醫方類編	八冊	二元二角八分
全國名醫驗案類編	四冊	四元八角

百病指南

(十五) (張治河)

肢體痠軟。全體津液。一為內熱消耗。一為肺臟吸去。關節失其濡養。故痿廢也。本症治法。宜首補肺生津。消痰清熱。如雲龍散。清熱解毒。滋陰潤肺。玉竹。麥冬。湯等。方。採擇用之可也。

此症者。切忌香燥之品。可以常食梨。柿。荸薺。甘蔗。葡萄。香。及牛乳。雞蛋肉汁等物。以滋潤生津。而佐藥力。更宜常在室氣新鮮之處。練習深呼吸法。既可藉其呼吸。而治不良之質。又可擴張肺臟。促進細胞活動。俾痿縮之處。漸得奮興。一舉數得。利莫大焉。

痰飲

本症原因。為氣管粘膜炎。西醫名為「慢性支氣管炎」。多因常患感冒。

肺癆肺癰肺瘰

陳耀堂

癰者。瘰也。如土之壅而不通。熱聚不散而為瘰也。金匱云。口中辟辟燥。胸中隱隱痛。脈反滑數者。此為肺癰。肺癰之候。其人咳嗽。膿血。氣味腥臭。凡患此症。或體質素熱。或為陰虛。或熱病之後。復感熱邪。或五臟溫熱之熱。與夫胃中停著之火上乘乎肺。肺受火熱。則為瘰之瘰。血為之瘰。由是浸淫而成癰。按其脈數而實。則大熱癰中可知。咳而喘滿。咽燥不渴。多唾濁沫。時時振寒者。乃熱則傷氣。氣不調和故咳而胸滿。氣不充足。故皮毛空疎而振寒。咽乾而時時唾濁沫者。津液被燥。熱邪迫肺而上行也。此即所謂熱之所過。血為之凝滯。畜積而膿。膿吐如米粥者也。斯時當去其熱邪。寧肺大寒湯。湯為主。除如神。湯水。有桔梗湯。或千金葶藶湯。桂枝去芍藥湯等。皆可加減施用。施藥之時。失治或誤治。則必致膿成而死。(按)近人有以鹹芥茶湯治肺癰服之有效。不效。然究屬丹方之類。未可謂確有